

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКОЙ АПРОБАЦИИ МАЗИ БЕЗОРНИЛ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОРРОЯ, ТРЕЩИН ЗАДНЕГО ПРОХОДА И ЭКЗЕМЫ ЗАДНЕГО ПРОХОДА

Исследовано 915 случаев

Пол:

- Мужчины — 638
- Женщины — 277

Возраст:

- Максимальный — 73 г.
- Минимальный — 16 л.

Критерии отбора:

- Геморрой: кровотечение, боль, отек.
- Трещины заднего прохода: кровотечение, боль, открытые раны.
- Экземы заднего прохода: зуд, выделения из заднего прохода, шелушение.

Оценка эффективности

Результаты лечения определялись как эффективные, удовлетворительные, неэффективные за определенное время:

- при геморрое — за 7 дней
- при трещинах заднего прохода — за 15 дней

Результаты лечения определялись как эффективные в случае исчезновения полностью или исчезновения в основном признаков заболевания.

Результаты лечения определялись как удовлетворительные в случае частичного исчезновения признаков заболевания.

Результаты лечения определялись как неэффективные в случае незначительных изменений.

Эффективность лечения геморроя

При лечении 624 случаев геморроя (включая послеоперационный) достигнуты следующие результаты:

эффективные в 449 случаях	71,96%
удовлетворительные в 144 случаях	23,08%
общая эффективность в 593 случаях	95,04%
неудовлетворительный результат — 31 случай	4,96%

Таблицы показывают эффективность и сроки действия мази для устранения кровотечения, боли и узлов при различных типах геморроя: наружном, внутреннем и смешанном.

Кровотечение

Тип	Кол-во больн.	Результаты лечения							
		Прекращение кровотечения			Удовлетворит. результат			Нет эффекта	
		Кол-во больн.	%	Дни	Кол-во больн.	%	Дни	Кол-во больн.	%
Внутренний геморрой	104	64	61.53	5	34	32.69	6.1	6	5.78
Смешанный геморрой	294	208	70.75	5.8	68	23.13	6.8	18	6.12
Внешний геморрой:									
острый	14	7	50	5.5	3	21.43	5	4	28.57
соединительная ткань	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сосудистый	1	-	-	-	1	100	4	-	-
трещина	2	1	50	4	2	100	5	-	-

тромбы	3	1	33.33	4	2	66.67	3	-	-
Послеоперационный	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	264	156	59.04 %	4.9 д.	80	30.30 %	7 д.	28	10.61 %

Боль

Тип	Кол-во больн.	Результаты лечения							
		Прекращение боли			Снижение боли			Нет эффекта	
		Кол-во больн.	%	Дни	Кол-во больн.	%	Дни	Кол-во больн.	%
Внутренний геморрой	35	25	71.43	4.1	10	28.57	4.8	-	-
Смешанный геморрой	98	68	69.39	5.6	26	26.53	5.3	4	4.08
Внешний геморрой:									
острый	79	53	67.09	4.8	22	27.85	5	4	5.06
соединительная ткань	23	18	78.26	7	5	21.74	-	-	-
сосудистый	3	1	33.33	3	5	66.67	-	-	-
тромбы	27	19	70.37	4.4	7	25.93	4	1	3.70
Послеоперационный	27	6	22.22	6	18	66.67	4	3	11.11
Итого	292	190	65.07 %	4.4 д.	90	30.82 %	5.1 д.	12	4.11 %

Отеки (узлы)

Тип	Кол-во больн.	Результаты лечения							
		Устранение			Уменьшение			Нет эффекта	
		Кол-во больн.	%	Дни	Кол-во больн.	%	Дни	Кол-во больн.	%
Внутренний геморрой	34	22	64.70	5.1	12	35.30	6	-	-
Смешанный геморрой	69	52	75.36	5.9	15	21.74	3.5	2	2.00
Внешний геморрой:									
острый	67	47	70.15	5.9	17	25.37	4.6	3	4.48
соединительная ткань	22	18	81.82	5	4	18.18	6	-	-
сосудистый	-	-	-	-	-	-	-	-	-
тромбы	21	16	76.19	4.8	5	23.81	4.7	-	-
Послеоперационный	1	-	-	-	1	100	3	-	-
Итого	145	90	62.07 %	4.4 д.	50	34.48 %	5.6 д.	5	3.45 %

Итог

Тип	Результаты лечения					
	Эффективно Кол-во больн.	%	Удовлетворительно Кол-во больн.	%	Нет эффекта Кол-во больн.	%
Внутренний геморрой	76	69.72	30	27.52	3	2.76
Смешанный геморрой	267	76.72	64	18.39	17	4.89
Внешний геморрой:						
острый	58	69.88	18	21.69	7	8.48
соединительная ткань	18	78.26	5	21.74	-	-
сосудистый	1	33.33	2	66.67	-	-
тромбы	22	70.97	8	25.81	1	3.22
Послеоперационный	7	25.93	17	62.96	3	11.11
Итого	449	71.96 %	144	23.08 %	31	4.96 %

Трещины заднего прохода

При лечении 223 случаев трещин заднего прохода в течение 15 дней эффективные результаты получены в 71,96%, удовлетворительные — в 22,4% случаев, общая эффективность — 92,38%, неудовлетворительный результат — в 7,62% случаев.

В том числе, при первичном заболевании общая эффективность составила 99,25% (эффективно — 80,09%, удовлетворительно — 17,16%), при хроническом — 82,03% (эффективно — 51,69%, удовлетворительно — 30,34%).

Таким образом препарат более эффективен при лечении первичного заболевания.

Таблицы показывают эффективность и сроки действия мази для устранения кровотечения, боли и заживления трещин при первичных и хронических трещинах заднего прохода.

Кровотечение при трещинах

Тип	Кол-во больн.	Результаты лечения						
		Прекращение кровотечения и удовлетворительный результат					Нет эффекта	
		Кол-во больн.	%	Время остановки кровотечения (дни)			Кол-во больн.	%
Макс.	Мин.			Ср.				
Первичный	124	116	93.55	9.3	3.4	5.6	8	6.45
Хроническая форма	87	70	80.46	-	-	-	17	19.54
Итого	206	186	90.29 %	10	3.8	6.9	20	9.71 %

Боль при трещинах

Симптом	Кол-во больн.	Результаты лечения						
		Прекращение или снижение боли					Нет эффекта	
		Кол-во больн.	%	Время прекращения боли (дни)			Кол-во больн.	%
Макс.	Мин.			Ср.				
Первичный анамнез	128	121	94.53	9.5	3	6.3	7	5.47
Хроническая форма	87	78	89.66	11	3.2	6.6	9	10.34
Итого	215	199	92.56 %	10.3	3	6.7	16	7.44

Заживление трещин

Симптом	Кол-во больн.	%	Результаты лечения		
			Время заживления (дни)		
			Макс.	Мин.	Ср.
Первичный анамнез	123	91.79	9.6	4.8	6.9
Хроническая форма	38	60.32	13.3	6	9.2
Итого	160	71.75 %	11.4	5.6	8.5

Общая эффективность

Тип	Результаты лечения					
	Хороший эффект		Удовлетворительный эффект		Нет эффекта	
	Кол-во больн.	%	Кол-во больн.	%	Кол-во больн.	%
Первичный	110	82.09	23	17.16	1	0.75
Хронический	46	51.69	27	30.34	16	17.97
Итого	156	69.96 %	50	22.42 %	17	7.62

Экземы заднего прохода

При лечении 68 случаев экземы заднего прохода, эффективные результаты получены в 27 случаях (39,71%), удовлетворительные — в 33 случаях (48,53%), общая эффективность — 88,24%, неудовлетворительно — 8 случаев (11,76%).

Таблицы показывают эффективность и сроки действия мази для устранения зуда, выделений и шелушения при острой и хронической экземе заднего прохода.

Зуд

Тип	Кол-во больн.	Результаты лечения						
		Излечение или улучшение		Время излечения (дни)			Нет эффекта	
		Кол-во больн.	%	Макс.	Мин.	Ср.	Кол-во больн.	%
Острая экзема	45	43	95.81	8	3.3	5.7	2	4.19
Хроническая экзема	21	19	90.48	10	-	6.3	2	9.52
Итого	66	62	93.94 %	-	4	7	4	6.06 %

Выделения

Симптом	Кол-во больн.	Результаты лечения						
		Излечение или улучшение		Время излечения (дни)			Нет эффекта	
		Кол-во больн.	%	Макс.	Мин.	Ср.	Кол-во больн.	%
Острая экзема	30	21	70.00	10	5.5	7.8	9	30.00
Хроническая экзема	14	7	50.00	10	6	8	7	50.00
Итого	44	28	63.64 %	10	5.8	7.9	16	36.36 %

Шелушение

Симптом	Кол-во больн.	Результаты лечения		
		Излечение или	Время	Нет

		улучшение		излечения (дни)			эффекта	
		Кол-во больн.	%	Макс.	Мин.	Ср.	Кол-во больн.	%
Острая экзема	23	8	34.78	10	4	7	15	65.22
Хроническая экзема	3	-	-	-	-	-	3	100
Итого	26	8	30.77 %	10	4	7	18	69.23 %

Общая эффективность

Симптом	Результаты лечения					
	Хороший эффект		Удовлетворительный эффект		Нет эффекта	
	Кол-во больн.	%	Кол-во больн.	%	Кол-во больн.	%
Острая экзема	22	46.81	19	40.43	6	12.76
Хроническая экзема	5	23.81	14	66.67	2	9.52
Итого	27	39.71 %	33	48.53 %	8	11.76 %

Результаты лечения кровотечения

Геморрой	Трещины заднего прохода
<ul style="list-style-type: none"> ■ 264 случая кровотечения. ■ Кровотечение остановилось полностью в 156 случаях (59,09%). ■ В среднем кровотечение было остановлено за 4,9 дня. ■ Самый длительный случай — 7 дней. ■ Самый быстрый случай — 3 дня. ■ Удовлетворительно (частичная остановка кровотечения) — 80 случаев (30%). ■ Общая эффективность — 89,39%. ■ Нет эффекта — 28 случаев (10,61%). 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 206 случаев кровотечения. ■ Кровотечение остановилось полностью или значительно в 166 случаях (90,29%). ■ Самый длительный случай — 15 дней. ■ Самый быстрый случай — 3,8 дня.

Обезболивающий эффект

Геморрой	Трещины заднего прохода
<ul style="list-style-type: none"> ■ 211 случаев боли. ■ Обезболивание наступило в 137 случаях (64,93%). ■ В среднем обезболивание наступило за 3,7 дня. ■ Уменьшение боли наблюдалось в 65 случаях (30,81%). ■ В среднем уменьшение боли наступало за 4,8 дня. ■ Общая эффективность — 95,74%. ■ Нет эффекта — 9 случаев (4,26%). 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 292 случая боли. ■ Обезболивание и снижение боли наступило в 280 случаях (95,89%). ■ В среднем обезболивание наступило за 4,75 дня. ■ Нет эффекта — 12 случаев (4,11%).

Результаты лечения отеков (узлов)

Из 145 случаев отеков, после применения препарата полное снятие отечности наступило в 90 случаях (62,07%), в среднем снятие отечности наступило за 4,4 дня, снижение отечности наблюдалось в 50 случаях (34,48%), в среднем снижение боли наступало за 5,6 дня, общая эффективность — 96,55%, неэффективно — 5 случаев (3,45%).

Результаты лечения трещин

Из 223 случаев отеков, после применения препарата полное излечение трещин наступило в 160 случаях (71,75%), в среднем излечение трещин наступило за 8,1 дня (наиболее длительное — 14 дней, наиболее короткое — 4 дня), неэффективно — 63 случая (28,25%).

Результаты лечения экземы

Из 66 случаев экземы, после применения препарата полное излечение и значительное улучшение наступило в 62 случаях (93,94%), неэффективно — 4 случаев (6,06%).

Резюме

На основании наблюдений 915 случаев клинической практики применения проитивогеморройной мази Безорнил для лечения геморроя, трещин заднего прохода, экземы и зуда заднего прохода, обнаружена его высокая эффективность.

Не было обнаружено ни одного случая побочных явлений.

Мазь Безорнил имеет высокую клиническую ценность в качестве средства лечения геморроя и рекомендуется для широкого применения в клинической практике.